

Erysipèle (complicquant un ulcère de jambe)

Définition

- Dermo hypodermite bactérienne non nécrosante
- Infection le plus souvent liée à *Streptococcus pyogenes* (sensibilité à la pénicilline de 100%)

Diagnostic

Grosse jambe rouge aiguë fébrile

- Début brutal compliquant un ulcère de jambe
- Placard inflammatoire extensif (unilatéral)
- Bourrelet périphérique
- Parfois décollement bulleux (+/- hémorragique)
- Fièvre + frissons
- Adénopathies inguinales homolatérales

Examen complémentaire

- Aucun dans les formes simples / non compliquées
- NFP et CRP montreraient un syndrome inflammatoire
- **Pas de prélèvement bactériologique cutané ni de la plaie**



Prise en charge

- Rechercher des signes de gravité → 
 - Diabète ou insuffisance cardiaque décompensés
 - Âge > 75 ans
 - Obésité
 - Pas d'amélioration dans les 72 h après le début du traitement antibiotique
 - Signes locaux → douleur ou hypoesthésie / induration crépitation sous cutanée / nécrose

- En l'absence de signe de gravité
 - Traitement ambulatoire
 - Amoxicilline ou pristinaamycine
 - Antalgiques
 - Repos au lit
 - Anticoagulation préventive si facteurs de risque

- Vérifier vaccination antitétanique

- Soins locaux de l'ulcère → voir fiche