

Hématome disséquant « ouvert »

Facteur de risque

- Peau fragile / Peau âgée
- Traumatisme
- Traitement anti coagulant

Risques

- Infection
- Hémorragie

Consignes générales

- Évaluer la profondeur → Explorer au stylet
- Lavage eau + savon
- Prise en charge de la peau péri lésionnelle
- Vérifier la vaccination antitétanique

Méchage des plaies ++++

Détersion



Plaie [noir] [jaune] [bleu] [bleu]

- Mécher et combler la cavité avec
 - Algostéril®
 - ou Tulle Sorbact®
- Pansement super absorbant*

Plaie [noir] [jaune] [bleu]

- Mécher et combler la cavité avec
 - Aquacel extra®
- Pansement secondaire
 - Pansement américain
 - Hydrocellulaire

Plaie [noir] [jaune] [bleu barré]

- Mécher et combler avec
 - Sorbact hydrogel®
 - ou Irrigo-absorbant
- Pansement secondaire
 - Pansement américain

Discuter systématiquement la TPN + instillation

Plaie cavitaire bourgeonnante

Plaie [rouge] [bleu] [bleu]

- Mécher la cavité avec
 - Algostéril®
 - Super absorbant *

Plaie [rouge] [bleu] [bleu barré]

- Mécher la cavité avec
 - Aquacel Extra®
- Pansement américain

Discuter systématiquement la TPN

* Drymax Easy® ou Cutimed Sorbion®