

Nécrobiose lipoiidique

Terrain

- **Diabète**
- **Post traumatique**



Diagnostic

Localisation typique → **crête tibiale**

- Uni ou bilatérale

Aspect clinique

- Papules/ Nodules rouges-bruns
- Plaques jaune-orangées
- Évolution atrophique
- Ulcération

Peau Péri Lésionnelle

- **Atrophie /**
- **Plages infiltrées Jaunes orangées**

Risques

- Exposition osseuse
- Exposition du tendon (tibial antérieur)

Examens complémentaires

- **Avis dermatologique souhaitable**
 - Affirmer le diagnostic

Prise en charge

Prise en charge générale

- Lavage à l'eau et au savon
- Vérifier la vaccination antitétanique
- Peau Péri Lésionnelle → crème émolliente

Détersion mécanique



- Risque d'aggravation
- Risque d'exposition osseuse ou tendineuse

Pansements humides



- Détersion mécanique ou chirurgicale
- Élimination du capot nécrotique
- Évacuation de l'hématome

Prise en charge spécifique



Sur avis spécialisé médical

- Corticothérapie locale
- Corticothérapie intra lésionnelle
- Tacrolimus pommade



Plaie 

- Alginate ou Urgotul®
- + pansement super absorbant

Plaie 

- Alginate ou fibres à HPA*
- + Pansement américain ou Hydrocellulaire

Plaie 

- Interface + Pansement américain
- Ou Hydrocellulaire siliconé

* HPA → Haut Pouvoir d'Absorption