

Reconnaitre ...

- **Lésions à contenu liquidien**
 - Mesurant > 5 mm \varnothing
 - Liquide clair ou hémorragique
 - Tendues ou flasques à la palpation
- Leur base peut être « normale » ou inflammatoire
- Des érosions arrondies
 - **Témoin d'une bulle préalable**
 - Érosion par effraction de la bulle
 - A l'emporte pièce
 - Uniques ou multiples
 - Avec parfois une collerette épidermique

Étiologies à évoquer ...

- Pemphigoïde bulleuse
- Bullose du diabétique
- Erysipèle
- Brulures

Examens complémentaires ...

- **Biopsie si besoin**
 - Diagnostic d'une pemphigoïde

Prise en charge ...



Avis spécialisé

- **Avis dermatologique pour un diagnostic étiologique précis**
- Discuter une biopsie cutané
- Envisager un traitement par dermocorticoïdes

Percer ou pas les bulles ?

- Percer pour limiter la pression du liquide et les douleurs
- Après désinfection locale
- Pansement → interface
 - pour limiter le retrait traumatique et douloureux

Dermocorticoïdes sur les érosions post bulleuses

- Sur avis médical après un diagnostic étiologique précis
- Pas avant d'avoir réalisé une biopsie si nécessaire
- Quantité à appliquer et durée d'application à respecter

